

QUE FAIRE SI ÇA NE VA PAS?

PROTOCOLE POUR LES ENFANTS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES

À titre indicatif seulement. Le jugement de l'éducatrice prédomine en tout temps!



IMPORTANT

Au CPE, l'acétaminophène peut être administré en présence de symptômes tels qu'inscrit au protocole d'administration d'acétaminophène du ministère de la famille. Il est **STRICTEMENT INTERDIT** d'administrer de l'acétaminophène au CPE pour d'autres douleurs.

Si l'acétaminophène est administré, l'état de l'enfant sera réévalué 60 minutes plus tard. À ce moment :

- Si l'enfant se porte mieux, il reste au CPE.
- Si l'enfant ne va pas mieux, il est ramené à la maison.

Symptôme : État général

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
L'état de santé limite la capacité de l'éducatrice à s'occuper des autres enfants		X
État de santé empêche l'enfant de participer aux activités du groupe		X

Symptôme : Présence de poux et / ou larves

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Lentes ou poux		X
Poux vivants - Infestation massive (100+ poux)		X
Pleurs persistants / Irritable / Grande fatigue / Somnolent		X

Symptôme : Fièvre

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Fièvre + État général normal	X	
Fièvre + Somnolent / Moche (Amélioration visible après avoir reçu acétaminophène)	X	
Fièvre + Somnolent / Moche (Sans amélioration 1h après prise acétaminophène)		X
Fièvre + Vomissement		X
Fièvre + Diarrhée		X
Fièvre + Diarrhée + Vomissement		X
Fièvre + Éruption cutanée (Amélioration visible après avoir reçu acétaminophène)	X	
Fièvre + Vésicules / Ulcères (pieds-mains-bouche) (Amélioration visible après avoir reçu acétaminophène)	X	

Symptôme : Éruption cutanée

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Éruption cutanée localisée sans fièvre	X	
Éruption cutanée généralisée sans fièvre	X	
Éruption cutanée + Fièvre (Amélioration visible après avoir reçu acétaminophène)	X	
Éruption cutanée + Somnolent / Moche / Fièvre (Sans amélioration 1h après prise acétaminophène)		X

Symptôme : Vomissements

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Vomissements - 1 fois	X	
Vomissements - 2 fois ou plus		X
Vomissements + Diarrhée		X
Vomissements + Fièvre		X
Vomissements + Diarrhée + Fièvre		X
Vomissements + Coup à la tête		X

Symptôme : Diarrhée (selle molle ou liquide)

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Diarrhée seulement - 1 fois (Contenu dans la couche / dans la toilette)	X	
Diarrhée seulement - 1 fois (Pas contenu dans la couche / 'accident' enfant propre)	X	
Diarrhée seulement - 2 fois ou plus (Contenu dans la couche / dans la toilette)		X
Diarrhée + Fièvre		X
Diarrhée + Vomissements		X
Fréquence des selles doublée par rapport à la normale de l'enfant		X
Selle + Sang / Mucus		X

Symptôme : Difficulté respiratoire

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Toux creuse	X	
Toux + Fièvre		X
Toux creuse + Écoulement nasal	X	
Toux creuse + Écoulement nasal + Fièvre		X
Quinte de toux - 1 fois (Se termine en vomissement)	X	
Quinte de toux - 2 fois ou plus (Se termine en vomissement)		X
Toux avec chant du coq		X
Détresse respiratoire (Essoufflement au repos, effort respiratoire, tirage)		X

Symptôme : Écoulement nasal

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Écoulement nasal seulement	X	
Écoulement nasal + Toux	X	
Écoulement nasal + Fièvre (Amélioration visible après avoir reçu acétaminophène)	X	
Écoulement nasal + Fièvre (Sans amélioration 1h après avoir reçu acétaminophène)		X

Symptôme : Problèmes oculaires (yeux)

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Yeux rouges ou gonflés (Sans sécrétions)	X	
Yeux rouges / Gonflés + Fièvre		X
Yeux rouges / Gonflés + Sécrétions	X	
Yeux rouges / Gonflés + Sécrétions + Fièvre		X
Sécrétions - 1 seul enfant dans le groupe	X	
Sécrétions - 2 enfants ou plus dans le groupe		X
Sécrétions - 3 enfants ou plus dans le CPE		X

Symptôme : Lésions cutanées

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Vésicules / Ulcères	X	
Vésicules / Ulcères + Fièvre (pieds-mains-bouche)		X
Vésicules / Ulcères + Fièvre + Moche		X
Vésicules (Qui sont couverts par un bandage imperméable)	X	
Écoulement (Qui ne peut pas être couvert par un bandage imperméable)		X

Symptôme : Oreilles

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Douleurs aux oreilles (Une ou deux oreilles)	X	
Écoulement de l'oreille (Qui se contient dans l'oreille)	X	
Écoulement de l'oreille (Qui s'écoule hors de l'oreille)	X	
Écoulement de l'oreille + Fièvre		X

Symptôme : Gorge

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Ganglions enflés + Mal de gorge	X	
Mal de gorge + Fièvre		X

Symptôme : Autre

Description	L'enfant peut rester au CPE	L'enfant doit rester à la maison
Convulsions		X

RÉFÉRENCES

Enfant malade au CPE.

[https://www.mamiesoleil.ca/client_file/upload/LES%20INSTALLATIONS/Enfant_malade_au_CPE_-_Octobre_2022_Parents\).pdf](https://www.mamiesoleil.ca/client_file/upload/LES%20INSTALLATIONS/Enfant_malade_au_CPE_-_Octobre_2022_Parents).pdf)

Guide pratique sur les maladies infectieuses en milieu de garde, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Critères d'exclusion d'un enfant d'un milieu de garde ou d'un milieu scolaire.

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003671/>

Politique relative aux enfants malades et à l'exclusion.

<https://www.petitsmurmures.com/wp-content/uploads/2019/09/Politique-relative-aux-enfants-malades-et-%C3%A0-l'exclusion-R2019-09-03.04-VF.pdf>